





Steril jel  steril  ambalajdadır. Buharla  steril edilmiştir, bu nedenle üründe etilen oksit artığı yoktur. Sterilite ve enfeksiyon giderici ajan  klorheksidin, iatrojenik enfeksiyonları önlemede yardımcıdır (kalıcı olmayan kateterlerde önemli). Yumuşak  anatomik başlıklı ve  kırılabilen uçlu (Patentli, travma tehlikesi yok) katlanabilir tüp, hem istediğiniz kadar  damlatmanıza, hem de gerektiğinde idrarı aspire etmenize olanak sağlar. Suda erir,  berraktır.  Doku uyumlu  iletkenlik, metal şaftlı  enstrümanlarla ideal birliktelik oluşturur. İçermiş olduğu lidokain'den ötürü ek bir anestetik etkiyi sağlamak mümkündür.  Kadınlar ve  erkekler için uygundur.



Cathejell

Lidocaine içerir




Cathejell

Lidocaine içerir




Üretra yapısı gereği narın bir organdır. Sadece bir kez uygulanan üretral kataterizasyon bile, üretral striktüre neden olabilir. Günümüzde üretra darlığı riski uygun lubrikan kullanımıyla azalmıştır.

Üretral kataterizasyonda/endoskopik girişimlerde önerilen, kataterin/endoskopik aletin lubrikanla sıvanması değil, üretranın tamamen lubrikan jel ile doldurulmasıdır.



Böylelikle, üretral katater/endoskopik alet, lubrikan jel içerisinde mesaneye yüzerek ulaşır ve üretra duvarı ile teması olmaz.



Üretra duvarının travmatize olma riski minimale indiği için, darlık riski de minimize edilmiş olur. Uygun kullanım için gerekli olan jel miktarı, kadın ve çocuklarda 6-7 gr iken, bu miktar 10.5 ml hacmi olan erkek üretrası için yeterli değildir. Bu nedenle, erkeklerde 12 gr'lık lubrikan jel kullanımı önerilmektedir.

Bileşimi:

Cathejell'in 100 g'ında: 2 g lidokain hidroklorür ve 0.05 g klorheksidin dihidroklorür vardır.

Farmakolojik özellikleri:

Cathejell steril, suda çözülebilir, renksiz, berrak, intrauretral yoldan uygulanan bir jeldir. Lidokain hidroklorid'in lokal anestezi etkisi vardır. Paranteral yoldan kullanıldığında antiaritmik etkisini gösterir. Kandaki maksimum konsantrasyon mukozaya yüksek dozda uygulandıktan sonra ve uzun kalma zamanından dolayı 1-2 mcg/ml'dir. Kan konsantrasyonu bir antiaritmik olarak intravenöz yoldan uygulandıktan sonra 1-6 mcg/ml'dir. Üretranın mukozasında ağır enflamasyon meydana geldiği takdirde yükselmiş lidokain absorpsiyonu beklenebilir. Klorheksidin çok sayıda gram-pozitif ile gram-negatif bakterilere karşı etkilidir. Aside dayanıklı bakterileri, sporları, mantarları ve virüsleri etkilemez. Belirtilen konsantrasyonda üretranın üst kısmında ve mesanede tedavi sonucu meydana gelmiş enfeksiyonlarda profilaktik olarak kullanılır.

Endikasyonları:

Katater ya da başka bir alet kullanılmadan önce kaydırıcı ve lokal anestetik olarak üretraya uygulanır.

Ticari şekli ve ambalaj içeriği:

Her biri %2 lidokain hidroklorür ve %0.05 klorheksidin dihidroklorür içeren 12.5 g'lık, 1 tüp içeren tek kullanımlık kutularda.

Kullanma süresi:

5 senedir



TAYMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Büyükdere Cad. Çayırçimen Sk. Emlak Kredi Blokları
A1 Blok Kat:2 D:11 80620 Levent/İSTANBUL
Tel: 0.212. 324 21 90 Pbx • Fax: 0.212 280 70 42
http://www.taymed.com.tr • E-mail: taymed@taymed.com.tr

Ruhsat Tarihi: 08 09 1995
Ruhsat Tarihi: 97 / 56
Daha fazla bilgi için
kuruluşumuza başvurunuz.